

INFORME TÉCNICO nº 03/2021

Campanha de Vacinação contra a COVID-19

Considerando as informações constantes no Segundo Informe Técnico da Campanha de Vacinação contra a COVID-19, publicado em 23/01/2021, pelo Ministério da Saúde, o Programa Estadual de Imunizações- RS esclarece:

1. Quanto à mudança na **Forma de Apresentação** e disponibilização da Vacina CoviShield Oxford/AstraZeneca:

Nesta segunda distribuição da vacina **Coronovac**, proveniente do laboratório Sinovac/Butantan, houve mudança na forma de apresentação da vacina, sendo disponibilizada em frasco multidose contendo 10 doses. O esquema vacinal compreende 2 doses com intervalo de **28 dias**.

A vacina **Covishield Oxford/AstraZeneca** também é disponibilizada em frascos multidoses com 10 doses, com esquema vacinal de 2 doses com intervalo de **12 semanas** entre elas. Neste primeiro momento está sendo disponibilizado aos Estados a D1.

Após abertos, os frascos podem permanecer sob refrigeração por até 6 horas (CoviShield Oxford/AstraZeneca) e por até 8 horas (Coronovac Sinovac/Butantan). Ao final do expediente e considerando a necessidade de otimizar doses ainda disponíveis em frascos abertos, deve-se direcionar o uso da vacina para pessoas contempladas em alguns dos grupos priorizados. **NÃO DEIXE DE VACINAR! NÃO DESPERDICE DOSES DE VACINA!**

Até o momento, salientamos que não há intercambialidade entre as vacinas contra a COVID-19 de diferentes laboratórios.

2. Quanto à vacinação em **Grupos Especiais**:

Para pacientes oncológicos, transplantados e demais imunossuprimidos – embora estas populações não façam parte do grupo avaliado nas pesquisas clínicas dos imunizantes, devido à tecnologia utilizada é improvável que sejam mais suscetíveis à eventos adversos. De toda forma, a vacinação deverá ocorrer sob prescrição médica, após avaliação de risco benefício pelo médico assistente e paciente. Pacientes com doenças reumáticas devem ser vacinados estando com a doença controlada ou em remissão e a decisão sobre a vacinação deve ser também individualizada.

3. Quanto à inaptidão para **doação de sangue** pós vacinação:

Por se tratar de vacina de vírus inativado, após a vacinação com a vacina Coronovac o indivíduo deve aguardar 48h após cada dose antes de realizar doação de sangue.

Para a vacina de Oxford/AstraZeneca deve-se aguardar um período de 7 dias após cada dose.

